


















## Übersicht der gängigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Kitas und Schulen (gemäß § 34 in Verbindung mit § 33 IfSG<sup>1</sup>)

**Erläuterung:**  bedeutet: umgehende Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt  
 bedeutet: Impfung ist möglich und von STIKO empfohlen

ERKRANKUNG	a) Inkubationszeit b) Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung nach Erkrankung <sup>1</sup>	Meldepflicht <sup>2</sup>	Impfung v. STIKO empfohlen?
Brechdurchfall- erkrankungen, auch ohne Erregernachweis	1-3 Tage	48 h nach Ende der Symptomatik	<b>Ja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Kindern unter 6</li> <li>bei mehr als 2 gleichzeitigen Erkrankungen</li> <li>auch Verdachtsfälle</li> </ul>	Entfällt
Rotaviren	a) 1-3 Tage	48 h nach Ende der Symptomatik	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle 	Ja 
Masern	a) 7-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Mumps	a) 16-18 Tage (möglich auch 12-25 Tage) b) Bis zu 9 Tage nach Beginn der Drüenschwellung	Nach Genesung, frühestens 9 Tage nach Schwellung der Drüsen	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Röteln	a) 14-21 Tage b) Bis zum Beginn des Ausschlags	Nach Ende der Symptomatik	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle 	Ja  MMR-Impfung
Windpocken	a) 14-21 Tage b) Bis zum Beginn des Ausschlags	Eine Woche nach Krankheitsbeginn möglich (Abheilen der Pocken)	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle	Ja 
Hepatitis A	a) 15-50 Tage; gewöhnlich 25-30 Tage b) 1-2 Wochen vor und bis zu 1 Woche nach Auftreten des Ikterus	2 Wochen nach Auftreten der ersten klinischen Symptome bzw. eine Woche nach Auftreten des Ikterus möglich.	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle	Ja 
Hepatitis E	a) 15-64 Tage	Nicht abschließend geklärt > Kontakt mit GA aufnehmen	<b>Ja</b> , auch Verdachtsfälle	Nein

<sup>1</sup> Wiederzulassungsempfehlungen des RKI: [https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung\\_Tabelle.pdf?blob=publicationFile&v=5](https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Wiederzulassung/Wiederzulassung_Tabelle.pdf?blob=publicationFile&v=5)

<sup>2</sup> Eine *Benachrichtigungspflicht* gegenüber dem Gesundheitsamt besteht grundsätzlich bei allen Infektionskrankheiten und Erkrankungen mit schwerem Verlauf (z. B. Krankenhausaufenthalt) oder einer außergewöhnlichen Häufung gleichartiger Infektionen in der Einrichtung.

<b>Keuchhusten</b>	a) 9-10 Tage (6-20 Tage möglich) b) Ohne Behandlung bis zu 3 Wochen, mit Antibiotika 3-7 Tage	5 Tage nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst 3 Wochen nach Beginn des Hustens	Ja, auch Verdachtsfälle	Ja 
<b>Meningokokken-Erkrankung</b>	a) 3-4 Tage (2-10 Tage möglich) b) Bis 24 h bei erfolgreicher Antibiotika-Therapie	Nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie und Genesung	Ja, auch Verdachtsfälle 	Ja 
<b>Haemophilus influenzae (Hib-Meningitis)</b>	a) 2-10 Tage b) Bis 24 h bei erfolgreicher Antibiotika-Therapie	Nach erfolgreicher Antibiotika-Therapie und Genesung	Ja, auch Verdachtsfälle 	Ja 
<b>Scharlach</b>	a) 1-3 Tage, selten länger b) 24 h nach Beginn einer Antibiotika-Therapie	24 h nach Beginn der Antibiotika-Therapie, sonst nach Genesung	Ja, auch Verdachtsfälle	Nein
<b>Ansteckende Borkenflechte</b>	a) 1-3 Tage, selten länger b) 24 h nach Beginn einer Antibiotika-Therapie	24 h nach Beginn der antibiotischen Therapie, sonst nach Abheilung der betroffenen Stellen	Ja, auch Verdachtsfälle	Nein
<b>Hand-Fuß-Mund-Krankheit</b>	a) 3-10 Tage (auch 1-30 Tage möglich) b) schon vor Auftreten der Bläschen	Nach Genesung	Nein	Nein
<b>Ringelröteln</b>	a) 7-18 Tage b) bis zum Beginn des Ausschlags	Nach Genesung	Nein	Nein
<b>Ansteckende Bindehautentzündung (Adenoviren)</b>	a) 5-12 Tage b) 14 Tage	Wiederzulassung nur mit ärztlichem Attest möglich	Ja, ab 2 Fällen	Nein
<b>Eitrige (bakterielle) Bindehautentzündung</b>	a) Entfällt b) 5-12 Tage je nach Erreger	Nach Genesung bzw. 24 h nach Beginn der Antibiotikagabe	Nein	Nein
<b>Krätze (Skabies)</b>	a) 4-6 Wochen b) Die Ansteckungsfähigkeit bleibt erhalten, solange Milben in der Haut nachzuweisen sind	Nach erfolgter Behandlung nach Plan	Ja, auch Verdachtsfälle	Nein
<b>Kopfläuse</b>	a) Entfällt b) Die Ansteckungsfähigkeit bleibt erhalten, solange noch Läuse sichtbar sind und nicht adäquat behandelt wurde	Nach erfolgter Behandlung nach Plan	Ja	Nein